

## DIFESA FINOCCHIO

Avversità	Criteri di intervento	S.a. e Ausiliari	Limitazioni d'uso e note
<b>CRITTOGAME</b>			
<b>Moria delle piantine</b> ( <i>Pythium spp.</i> )	<b>AGRONOMICO:</b> -Effettuare ampi avvicendamenti; -Utilizzare materiale vivaistico sano nelle colture da trapianto.	<i>Trichoderma spp.</i>	
<b>Tracheovorticilliosi</b> ( <i>Verticillium spp.</i> )	<b>AGRONOMICO:</b> - Effettuare ampi avvicendamenti; - Utilizzare seme sano; - Allontanare e distruggere le piante malate.		Nessun intervento chimico
<b>Marciume basale</b> ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ) ( <i>Sclerotinia minor</i> )	<b>AGRONOMICO:</b> -Ampi avvicendamenti colturali; -Limitare le irrigazioni ed evitare ristagni idrici; -Evitare gli eccessi d'azoto. <b>CHIMICO:</b> -Intervenire preventivamente nei periodi a rischio, bagnando bene la base delle piante	<i>Coniothyrium minitans</i> Fludioxinil+ Cyprodinil (1)	(1) al massimo 2 interventi con questo prodotto per ciclo colturale
<b>Marciume del grumolo</b> ( <i>Phoma spp.</i> )	<b>AGRONOMICO:</b> -Effettuare ampi avvicendamenti; -Evitare ristagni di umidità; -Utilizzare seme sano; -Allontanare e distruggere le piante malate.		Nessun intervento chimico
<b>Rizzotoniosi</b> ( <i>Rhizoctonia solani</i> )	<b>AGRONOMICO:</b> -Ampi avvicendamenti colturali; -Limitare le irrigazioni ed evitare ristagni idrici; -Utilizzare seme sano e conciato.	<i>Trichoderma spp.</i>	Nessun intervento chimico
<b>Antracnosi</b> ( <i>Marssonina panattoniana</i> )	<b>CHIMICO:</b> -Intervenire in via preventiva o alla comparsa dei primi sintomi.	Prodotti rameici (1)	(1) Efficaci anche contro il marciume del grumolo
<b>Botrite</b> ( <i>Botrytis cinerea</i> )	<b>AGRONOMICO:</b> -Curare l'irrigazione ed evitare ristagni idrici. <b>CHIMICO:</b> -Intervenire in via preventiva o alla comparsa dei primi sintomi.		Nessun intervento chimico
<b>Alternaria</b> ( <i>Alternaria dauci</i> )	<b>AGRONOMICO:</b> - Ampi avvicendamenti colturali; -Utilizzare seme sano e conciato; -Realizzare le irrigazioni evitando di causare prolungata bagnatura delle piante. <b>CHIMIC:</b> -Intervenire in via preventiva o alla comparsa dei primi sintomi.	Prodotti rameici	

<b>Avversità</b>	<b>Criteri di intervento</b>	<b>S.a. e Ausiliari</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Peronospora</b> ( <i>Plasmopara crustosa</i> ) ( <i>Phytophthora syringae</i> )	<b>AGRONOMICO:</b> -Ampi avvicendamenti colturali; -Curare l'irrigazione ed evitare ristagni idrici; -Distruggere i residui delle colture ammalate; -Distanziare maggiormente le piante; -Uso di varietà resistenti/tolleranti. <b>CHIMICO:</b> -I trattamenti vanno programmati in presenza delle condizioni climatiche (piogge frequenti e alta umidità) predisponenti la malattia.	Prodotti rameici (1)	(1) Efficaci anche contro il marciume del grumolo
<b>Ramularia</b> ( <i>Ramularia foeniculi</i> )	<b>AGRONOMICO:</b> -Effettuare ampi avvicendamenti; -Impiego di seme sano o conciato. <b>CHIMICO:</b> -Intervenire alla comparsa dei primi sintomi, in presenza delle condizioni climatiche (piogge frequenti e alta umidità) predisponenti la malattia.	Prodotti rameici Difenoconazolo (1) (2)	<b>(1) Al massimo 2 interventi per ciclo colturale</b> <b>(2) Attivo anche contro alternaria, ruggini e oidio.</b>
<b>Oidio</b> ( <i>Erysiphe umbrelliferarum</i> )	<b>CHIMICO:</b> -Intervenire alla comparsa dei primi sintomi ed al perdurare delle condizioni climatiche favorevoli.	Zolfo	
<b>Batteriosi</b> ( <i>Erwinia carotovora subsp. Carotovora</i> ) ( <i>Pseudomonas marginalis pv Marginalis</i> )	<b>AGRONOMICO:</b> -Ampi avvicendamenti colturali; -Concimazioni azotate e potassiche equilibrate; -Eliminazione della vegetazione infetta, che non va comunque interrata; -Utilizzare seme sano; -Evitare ristagni idrici; -Evitare di provocare lesioni alle piante; -Non irrigare con acque stagnanti a rischio di contaminazione batterica; -Utilizzare fertilizzanti in grado di stimolare i meccanismi di resistenza naturale delle piante. <b>CHIMICO:</b> -Trattamenti pre-rincazzatura.	Prodotti rameici (1)	(1) Efficaci anche contro il marciume del grumolo
<b>Ruggini</b> ( <i>Puccinia spp.</i> ) ( <i>Uromyces graminis</i> ) ( <i>Aecidium foeniculi</i> )	<b>CHIMICO:</b> -Intervenire alla comparsa dei primi sintomi	Prodotti rameici	
<b>Cercosporiosi</b> ( <i>Cercospora foenicula</i> )	<b>AGRONOMICO:</b> -Effettuare ampi avvicendamenti; -Impiego di seme sano o conciato. <b>CHIMICO:</b> -Intervenire alla comparsa dei primi sintom in presenza delle condizioni climatiche (piogge frequenti e alta umidità) predisponenti la malattia.	Prodotti rameici Dodina (1)	<b>(1) 1 intervento per tale avversità, al massimo 2 interventi con questo prodotto per ciclo colturale</b>
<b>FITOFAGI</b>			
<b>Afidi</b> ( <i>Dysaphis foeniculus</i> ) ( <i>Hyadaphis foenuculi</i> ) ( <i>Cavariella aegopodi</i> ) ( <i>Dysaphis apiifolia</i> )	<b>CHIMICO:</b> -Intervenire nelle prime fasi di sviluppo della pianta, nel caso di accertata presenza del litofago.	Lambda-cialotrina (1) Azaridactina Piretro naturale	<b>(1) Al massimo 2 interventi con piretroidi per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità</b>

<b>Avversità</b>	<b>Criteri di intervento</b>	<b>S.a. e Ausiliari</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Tripidi</b> ( <i>Frankliniella occidentalis</i> ) ( <i>Trips spp.</i> )	<b>CHIMICO:</b> -Intervenire nelle prime fasi di sviluppo della pianta, nel caso di accertata presenza del litofago.	Lambda-cialotrina (1) Azaridactina Spinosad (2) Piretro naturale	(1) Al massimo 2 interventi con piretroidi per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità (2) Al massimo 2 interventi all'anno, indipendentemente dall'avversità
<b>Nottue fogliari</b> ( <i>Spodoptera exigua</i> ) ( <i>Spodoptera litoralis</i> ) ( <i>Heliotis armigera</i> )	<b>CHIMICO:</b> -Intervenire in caso di infestazione generalizzata, specialmente nei primi stadi vegetativi; -Alternare i principi attivi tra di loro.	<i>Bacillus thuringiensis</i> Lambda-cialotrina (1) Spinosad (2)	(1) Al massimo 2 interventi con piretroidi per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità (2) Al massimo 2 interventi all'anno, indipendentemente dall'avversità
<b>Nottue terricole</b> ( <i>Agrotis spp.</i> )	<b>CHIMICO:</b> -Intervenire tempestivamente in caso di accertata presenza.	<i>Bacillus thuringiensis</i>	
<b>Elateridi</b> ( <i>Agriotes spp.</i> )	<b>CHIMICO:</b> -Intervenire in seguito alla accertata presenza di larve.	Teflutrin (1)	(1) Localizzato al trapianto o alla semina lungo la fila
<b>Chioccioline e limacee</b> ( <i>Helix spp.</i> ) ( <i>Cantareus aperta</i> ) ( <i>Helicella variabilis</i> ) ( <i>Limax spp.</i> ) ( <i>Agriolimax spp.</i> ) ( <i>Deroceras reticulatum</i> ) ( <i>Arion spp.</i> )	<b>CHIMICO:</b> -Solo in caso di infestazione generalizzata -Distribuire preferibilmente il prodotto sulle fasce perimetrali o nelle zone interessate.	Metaldeide-esca	
<b>Nematodi galligeni</b> ( <i>Meloidogyne spp.</i> )	<b>AGRONOMICO:</b> - Ampi avvicendamenti colturali - Uso di varietà resistenti - Utilizzo in precessione di specie da sovescio con attività bio-nematocida		