

**DISERBO CARCIOFO**

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
<b>Pre-trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1) Pendimetalin	30,4 31,7	1,5 - 3 2 - 3	(1) Utilizzare in presenza di infestanti emerse
<b>Pre-emergenza Pre-ricaccio</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Oxifluorfen Linuron	23,8 37,6	1 - 2 0,8 - 1,5	
<b>Post-emergenza Post-ricaccio</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Oxadiazon(1) (2) Oxifluorfen (1) (2) Metazaclor	34,1 23,8 43,5	1 - 2 1 - 2 1,5 - 2	<b>(1) Contro l'oxalis nelle prime fasi fenologiche</b> <b>(2) Proteggere le foglie con opportuna schermatura;</b>
<b>Post-emergenza Post-ricaccio</b>	Graminacee	Ciclofidim Propaquizafop Fenoxaprop-p-etile Quizalofop-etile isomero D Quizalofop-p-etile	10,9 9,7 6,6 4,9 5	1,5 1 1 - 1,5 1 - 1,5 1 - 1,5	