

**DISERBO POMODORO DA PIENO CAMPO E DA INDUSTRIA**

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
<b>Pre semina e Pre Trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate	30,4	1,5 - 3	<b>Le dosi maggiori sono utilizzabili solo in strategie finalizzate all'eliminazione di infestanti perenni</b> Utilizzare in presenza di infestanti emerse
<b>Pre emergenza</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Metribuzin Aclonifen	35 49	0,15 - 0,25 1,5 - 2	<b>Non intervenire in terreni sabbiosi</b> <b>Sono ammessi solo interventi localizzati sulla fila</b>
<b>Pre Trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Aclonifen Flufenacet Metribuzin Oxadiazon Pendimetanil S-Metolaclo (1)	49 60 35 34,10 31,70 87,3	1,5 - 2 0,6 - 0,85 0,3 - 0,5 1 2 - 3 1 - 1,5	<b>(1) Intervenire almeno 10 giorni prima del trapianto</b>
<b>Post emergenza e Post trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Rimsulfuron	25	0,03 - 0,05	Intervenire precocemente alla prima emergenza delle infestanti, anche a basse dosi e con eventuali applicazioni ripetute Si consigliano interventi localizzati sulla fila
		Metribuzin	35	0,2 - 0,5	In presenza di portulaca la dose può salire fino a Kg 1 per Ha Si consigliano interventi localizzati sulla fila
	Graminacee	Cicloxidim Quizalofop-etile Isomero D Quizalofop-p-etile Propaquizafop Fenoxaprop-p-etile	21 4,9 5 9,7 6,77	0,75 - 1,25 1 - 1,5 1 - 1,5 1 1 - 1,5	Si consigliano interventi localizzati sulla fila