

DISERBO ASPARAGO

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
Pre-Trapianto Pre Ricaccio e/o Post Raccolta	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate Glufosinate - ammonio	30,4 11,33	1,5 - 3 4 - 7	Preparare definitivamente il terreno circa un mese prima dell'impianto (falsa semina) ed intervenire a pochi giorni dalla stessa Utilizzare in presenza di infestanti emerse
Pre Trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Clorprofam	40,8	4	
Pre ricaccio e Post raccolta	Graminacee e Dicotiledoni	Metribuzin (1) Pendimetanil (1) Dicamba Oxadiazon	35 31,7 21 34,1	0,4 – 0,7 2 - 3 0,2 – 0,5 1,5	E' opportuno alternare i prodotti nella fase di pre ricaccio per evitare che si selezionino specifiche malerbe (1) Rispettare 60 gg di carenza
Post raccolta	Graminacee	Propaquizafop Ciclossidim	9,7 10,9	1 1,5 - 2,5	

E' vietato il diserbo chimico in coltura protetta