



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

ALLEGATO C
MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL TEST GAMMA-INTERFERON PER TUBERCOLOSI BOVINA

I prelievi devono essere effettuati contestualmente all'inoculo della tubercolina, su tutti gli animali di età superiore ai 3 mesi, ad intervalli di almeno 42 giorni.

Da ogni animale devono essere prelevate due provette di sangue utilizzando vacutainer con anticoagulante litio eparina (tappo verde) al volume di almeno 5 ml per provetta.

I campioni devono essere tenuti a temperatura ambiente e consegnati direttamente all'IZS della Sardegna sede di Sassari entro 8 ore dal prelievo e non più tardi delle ore 14.00, ad esclusione del venerdì (da concordare preventivamente con il Laboratorio di Sieroimmunologia).

Utilizzare quale scheda di accompagnamento dei campioni il modello 2/33.

Gli animali risultati positivi al test devono essere prontamente abbattuti al pari di quelli risultati positivi alla prova intradermica.