



**DISERBO DEI FRUTTIFERI (POMACEE, DRUPACEE, MANDORLO), DELL'OLIVO E DEGLI AGRUMI**

<i><b>Infestanti controllate</b></i>	<i><b>Sostanza attiva</b></i>	<i><b>% di S.a.</b></i>	<i><b>l o kg /ha/ anno</b></i>	<i><b>Limitazioni d'uso e note</b></i>
Monocotiledoni e Dicotiledoni	Glifosate (1) Glifosate + Diflufenicam (11) (12) Flazasulfuron + Glifosate (13)	30,4 25 + 4 0,67 + 28,8	7,5 2 – 3 2,25	<p>Le dosi impiegate si intendono per ettaro. La superficie effettivamente trattata deve essere sempre inferiore o uguale al 50% della superficie complessiva.</p> <p>(1) Su agrumi al massimo 6 l/ha/anno. (2) Per gli agrumi, ammesso solo su arancio, limone e pompelmo. (3) Quando utilizzato in miscela impiegare dosi ridotte (0,3 – 0,45 litri/ha) (4) attivo solo sulle infestanti in fase di pre-emergenza; (5) Intervenire solo nel periodo invernale (6) Non utilizzare sul mandorlo. (7) Non impiegare su terreni sabbiosi; (8) Drupacee: ammesso solo su albicocco, pesco e susino; (9) intervenire solo su impianti in allevamento fino a tre anni; (10) Non ammesso su olivo (11) Interventi ammessi solamente nei primi 3 anni d'impianto, da effettuarsi sulla fila nel periodo compreso tra la raccolta e la fioritura (12) Non ammesso su pomace, drupacee e mandorlo.</p>
	Oxifluorfen (2) (3) (10) Pendimetalin (4) (5) (6) (7) (9) (11) Oxadiazon (8) (9) (12)	23,8 38,72 34,86	1 2 4	
Dicotiledoni	MCPA (1) (5) Fluroxiypir (2) (3) (4) (5)	20,5 20,6	3 1,5	<p>(1) Ammesso solo su melo, pero e arancio (2) Ammesso solo su agrumi, melo e olivo (3) Utilizzare anche in presenza infestante di malva e/o rovo (4) Non utilizzare su siepi di rovo posti a bordura dei campi (5) Efficace su convolvolo</p>



## DISERBO DEI FRUTTIFERI (POMACEE, DRUPACEE, MANDORLO), DELL'OLIVO E DEGLI AGRUMI

<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha/ anno</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
Monocotiledoni e Dicotiledoni	Carfentrazone (1) (2) (3) (4)	6,45	1	1) Ammesso solo su melo, pero, pesco, susino, olivo, agrumi 2) Al massimo 0,3 l/ha per ciascun intervento 3) Efficace come spollonante ammesso su melo, pero e olivo; 4) Per i giovani impianti in allevamento è possibile innalzare la dose fino a 2 litri/anno; 5) Non utilizzare su, Mandorlo e Agrumi. 6) Ammesso come spollonante (in alternativa al Carfentrazone) e come sinergizzante
Spollonante	Pyraflufen-ethile (5) (6)	2,5	0,8	
Monocotiledoni e Dicotiledoni	Pyraflufen-ethile (2)	2,5	0,25 - 0,3 (1)	(1) Dosi che devono essere considerate nell'utilizzo come sinergizzante (2) Non utilizzare su Mandorlo e Agrumi.
Graminacee	Fluazifop-p-butile (1) (2) (3) Quizalofop P etile	13,4 5,4	1 1 - 1,5	(1) Drupacee: non ammesso su albicocco e mandorlo; (2) Non utilizzare su terreni sabbiosi; (3) Massimo 1 intervento all'anno;

**Nota:** su noce, nocciolo e castagno, il diserbo chimico non è ammesso.